

# 追加接種(3回目)のお知らせ

新型コロナワクチンの追加接種(3回目)については、2回目接種完了から原則8か月以上経過した方を対象に実施することとされていますが、国から接種間隔の前倒しの考え方が示されたため、対象の方は下記のとおり8か月以上の経過を待たずに追加接種(3回目)を受けていただけます。

国が示す前倒しの考え方 令和4年1月13日現在

対象者	2回目からの接種間隔
1.医療従事者等 2.高齢者施設等の入所者及び従事者 3.通所サービス事業所の利用者及び従事者 4.病院などの入院患者	6か月以上
5.上記1～4に該当しない高齢者(65歳以上)	7か月以上 (令和4年2月以降接種可能)
6.それ以外	原則8か月以上



## 接種間隔前倒しに伴うクーポン券の発送時期と3回目接種の時期などの目安

スケジュールの前倒しに伴い、クーポン券の発送時期などを見直しました。

主な対象者	2回目接種の終了時期	3回目接種クーポン券発送時期(予定)	3回目接種可能時期(予定)
①高齢者施設等の入所者・従事者等	令和3年6月・7月	令和4年1月12日	令和4年1月以降
②高齢者等	令和3年6月	令和4年1月末頃	令和4年2月中旬以降
③上記以外の令和3年7月に2回目接種完了された方	令和3年7月	令和4年2月下旬頃	令和4年3月上旬以降

2回目接種の終了月が令和3年8月以降の方々にも、上記同様に2回目接種完了の時期にあわせてクーポン券を順次送付する予定です。

接種時期やクーポン券の送付時期については、ワクチンの供給状況等により変更することがあります。

## 追加接種(3回目)の住民接種を開始します。

予約開始時期は2月上旬、接種開始時期は、2月中旬を予定しています。

### ワクチン接種までの流れ

- ① 上記のスケジュールにより接種クーポン券(通知)が自宅に届きます。
- ② 接種予約を行います。接種予約専用コールセンターに電話予約かインターネット予約により接種予約を行います。予約に必要な情報は、接種クーポン券に同封する案内文をご覧ください。

#### 【接種実施場所】 町内の病院や診療所9施設

えさき小児科内科医院・くにたけ医院・たなか医院・津留医院・野口医院・松本医院・みずま高邦会病院・宮原泌尿器科クリニック・よこやま外科乳腺クリニック

裏面もご覧ください⇒

## 追加接種に使用するワクチン

1・2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社または武田/モデルナ社のワクチンを使用します。ファイザー社は1・2回目の接種量と同量ですが、武田/モデルナ社は半量になります。

### ◎3回目の接種の安全性と効果

安全性

ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状が見られました。

効果

3回目の接種をした人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。

### ◎1・2回目と異なるワクチンを用いて3回目接種した場合の安全性と効果

英国では、2回目接種から12週以上経過した後に、様々なワクチンを用いて3回目接種を行った場合の研究が行われ、その結果が報告されています。

安全性

3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性の面で許容されること

効果

1・2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、3回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田/モデルナ社ワクチン（※）を受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇すること

（※）武田/モデルナ社ワクチンは、3回目は50 µg接種することになっているが、本研究では100 µg接種した結果が報告されている。

ワクチンの組み合わせ			抗体価
ファイザー	→	ファイザー → モデルナ	抗体価は 上昇
ファイザー	→	ファイザー → ファイザー	

出典：Munro APS, et al. The Lancet. December 2021

## よくあるご質問

### Q.武田/モデルナ社のワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか。

A.武田/モデルナ社のワクチンにおける3回目接種は、1・2回目接種で用いた量の半量となります。2回目接種後と比較して、発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています。  
(注) 接種後の症状のうちリンパ節症は、2回目よりも3回目の方が多く見られます。 出典：特例承認に係る報告書より

### Q.ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの効果に差はありますか。

A.1・2回目の接種では、ファイザー社と武田/モデルナ社のいずれも、2回目接種から約半年後も高い重症化予防効果（※）が維持されています。  
ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの1・2回目接種の効果を約半年間比較した観察研究では、武田/モデルナ社のワクチンの方が、感染予防、発症予防、重症化予防（※）の効果が有意に高かったと報告されています。  
（※）重症化予防には入院予防を含む。

出典：Rosenberg ES, et al. medRxiv, 2021. / Self WH, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021. / Dickerman BA, et al. NEJM. December 1, 2021.

### ◎ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

### ◎予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

申請に必要な手続きなどについては、大木町役場健康福祉課にご相談ください。



大木町役場ホームページから最新情報をご確認ください。

QRコードはこちら

【問合せ先】大木町役場健康福祉課 ☎ 0944-32-1280